arXiv:1409.4553v1 [math.ST] 16 Sep 2014

О НОВЫХ СЛАБО ПЕРИОДИЧЕСКИХ ГИББСОВСКИХ МЕРАХ МОДЕЛИ ИЗИНГА НА ДЕРЕВЕ КЭЛИ

М.М.Рахматуллаев [1]

Аннотация

Рассматривается модель Изинга на дереве Кэли. Для модели Изинга найдены новые слабо периодические меры, соответствующие нормальным делителям индекса 2 группового представления дерева Кэли.

Ключевые слова: дерево Кэли, мера Гиббса, модель Изинга, слабо периодические меры.

УДК.517.98+530.1

Abstract

We consider Ising model on the Cayley tree. For the Ising model, we find a new weakly periodic Gibbs measures corresponding to normal subgroups of indices two in the group representation of a Cayley tree.

Key words: Cayley tree, Gibbs measure, Ising model, weakly periodic measure.

1. Введение

Каждой мере Гиббса сопоставляется одна фаза физической системы. Если существует более чем одна мера Гиббса, то говорят, что существуют фазовые переходы. Основная проблема для данного гамильтониана - это описание всех отвечающих ему предельных мер Гиббса. Эти меры, в основном, были трансляционно-инвариантными, либо периодическими с периодом два. Более того, для многих моделей на дереве Кэли доказано, что множество периодических мер Гиббса очень бедно, т.е. существуют периодические гиббсовские меры с периодом два. В работах [1]- [3] для модели Изинга описаны трансляционно-инвариантные меры Гиббса на дереве Кэли. Описанию периодических гиббсовских мер для некоторых моделей с конечным числом радиуса взаимодействия, которые, в основном, были либо трансляционно-инвариантными, либо периодическими с периодом два, посвящены работы ([4], [6]), .

Чтобы получить более широкое множество гиббсовских мер, в работах [8]- [11] введены более общие понятия периодической меры Гиббса, т.е. слабо периодические гиббсовские меры и доказано существование таких мер для модели Изинга на дереве Кэли. В работах [1], [7], [11] изучены континуальные множества непериодических мер Гиббса для модели Изинга на дереве Кэли.

[1]Институт математики, ул. Дурмон йули, 29, Ташкент, 100125, Узбекистан.
E-mail: mrahmatullaev@rambler.ru

В работах [8] и [9] на некоторых инвариантных множествах при некоторых условиях на параметры найдены слабо-периодические (не периодические) меры Гиббса для модели Изинга на дереве Кэли. Настоящая работа является продолжением работ [8] и [9]. Доказывается существование новых мер Гиббса, отличных от мер, описанных в работах [8] и [9].

Структура работы: В пункте 2 даются основные определения и постановка задачи. Пункт 3 посвящен слабо периодическим мерам Гиббса.

2. Основные определения и постановка задачи

Пусть $\tau^k = (V, L), k \geq 1$ есть дерево Кэли порядка k, т.е. бесконечное дерево, из каждой вершины которого выходит равно $k+1$ ребер, где V - множество вершин, L - множество ребер τ^k.

Пусть G_k - свободное произведение $k+1$ циклических групп $\{e, a_i\}$ второго порядка с образующими $a_1, a_2, ...a_{k+1}$, соответственно т.е. $a_i^2 = e$.

Существует взаимно-однозначное соответствие между множеством вершин V дерево Кэли порядка k и группой G_k(см. [1], [12]).

Это соответствие строится следующим образом. Произвольной фиксированной вершине $x_0 \in V$ поставим соответствие единичный элемент e группы G_k. Так как рассматриваемый граф без ограничения общности можно считать плоским, то каждой соседней вершине точки x_0 (т.е. e) поставим в соответствие образующую $a_i, i = 1, 2, ...k+1$ по положительному направлению (см. рис.1).

Теперь в каждой вершине a_i определим слово длины два $a_i a_j$ соседних вершин a_i. Так как одна из соседних вершин вершины a_i есть e, то положим $a_i a_i = e$ и тогда нумерация остальных соседних вершин a_i производится однозначно по вышеприведенному правилу нумерации. Далее, для соседних вершин вершины $a_i a_j$ определим слово длины три следующим образом. Так как одна из соседних для $a_i a_j$ вершин есть a_i, то положим $a_i a_j a_j = a_i$ и тогда нумерация остальных соседних вершин производится однозначно и имеют вид $a_i a_j a_l, i, j, l = 1, 2, ...k+1$. Это соответствие согласуется с предыдущим шагом, так как $a_i a_j a_j = a_i a_j^2 = a_i$. Таким образом, можно установить взаимно-однозначное соответствие между множеством вершин дерева Кэли τ^k и группой G_k.

Представление, построенное выше, называется правым, т.к. в этом случае если x и y соседние вершины, а g и $h \in G_k$ соответствующие им элементы группы, тогда либо $g = ha_i$, либо $h = ga_j$ для некоторых i или j. Аналогично определяется левое представление.

Рассмотрим в группе G_k (соответственно на дереве Кэли) преобразование левого (правого) сдвига, определяемые следующим образом: для $g \in G_k$ положим

$$T_g(h) = gh, (T_g(h) = hg), \quad \forall h \in G_k.$$

Совокупность всех левых (правых) сдвигов на G_k изоморфна группе G_k.



Рис. 1: *Дерево Кэли τ^2 и элементы группового представления вершин.*

Любое преобразование S группы G_k индуцирует преоброзование $\widehat{S}$ на множестве вершин V дерева Кэли τ^k. Поэтому мы отоджествляем V и G_k.

Теорема 1. *Группа левых (правых) сдвигов на правом (левом) представлении дерева Кэли является группой трансляций.(см. [1], [12])*

Для произвольной точки $x^0 \in V$ положим $W_n = \{x \in V | d(x^0, x) = n\}$, $V_n = \bigcup_{m=0}^{n} W_m$, $L_n = \{< x, y > \in L | x, y \in V_n\}$, где $d(x, y)$-расстояние между x и y на дереве Кэли, т.е. число ребер пути, соединяющее x и y .

Пусть $\Phi = \{-1, 1\}$ и $\sigma \in \Omega = \Phi^V$ конфигурация, то есть $\sigma = \{\sigma(x) \in \Phi : x \in V\}$. Пусть $A \subset V$. Обозначим через Ω_A пространство конфигураций, определенных на множестве A и принимающих значения из $\Phi = \{-1, 1\}$.

Рассмотрим гамильтониан модели Изинга

$$H(\sigma) = -J \sum_{<x,y>\in L} \sigma(x)\sigma(y), \tag{1}$$

где $J \in R, < x, y >$ - ближайшие соседи. Заметим, что элементы x, y группы G_k являются соседними, если существует образующая a_i т.е. $x = ya_i$.

Пусть $h_x \in R, x \in V$. Для каждого n определим меру μ_n на Ω_{V_n}, полагая

$$\mu_n(\sigma_n) = Z_n^{-1} \exp\{-\beta H(\sigma_n) + \sum_{x \in W_n} h_x \sigma(x)\}, \tag{2}$$

где $\beta = \frac{1}{T}$ ($T > 0$-температура), $\sigma_n = \{\sigma(x), x \in V_n\} \in \Omega_{V_n}$, $Z_n^{-1}-$ нормирующий множитель и

$$H(\sigma_n) = -J \sum_{<x,y>\in L_n} \sigma(x)\sigma(y).$$

Условие согласованности для $\mu_n(\sigma_n), n \geq 1$, определяется равенством

$$\sum_{\sigma^{(n)}} \mu_n(\sigma_{n-1}, \sigma^{(n)}) = \mu_{n-1}(\sigma_{n-1}), \tag{3}$$

где $\sigma^{(n)} = \{\sigma(x), x \in W_n\}$.

Пусть $\mu_n, n \geq 1$ - последовательность мер на Ω_{V_n}, обладающая свойством согласованности (3). Тогда в силу теоремы Колмогорова существует и притом единственная предельная мера μ на $\Omega_V = \Omega$ (которая называется предельной мерой Гиббса) такая, что для каждого $n = 1, 2, ...$

$$\mu(\sigma_n) = \mu_n(\sigma_n).$$

Известно, что меры (2) удовлетворяют (3) тогда и только тогда, когда совокупность величин $h = \{h_x, x \in G_k\}$ удовлетворяет

$$h_x = \sum_{y\in S(x)} f(h_y, \theta), \tag{4}$$

где $S(x)$- множество "прямых потомков"точки $x \in V$ и $f(x, \theta) = arcth(\theta thx)$, $\theta = th(J\beta)$, $\beta = \frac{1}{T}, T > 0$ температура (см. [1], [2], [3]).

Определение 1. *Совокупность величин $h = \{h_x, x \in G_k\}$ называется $\widehat{G}_k$-периодической, если $h_{xy} = h_x$ для $\forall x \in G_k, y \in \widehat{G}_k$. G_k-периодическая мера называется трансляционно-инвариантной.*

Для $x \in G_k$ обозначим через $x_\downarrow = \{y \in G_k :< x, y >\}\backslash S(x)$.

Пусть $G_k/\widehat{G}_k = \{H_1, ..., H_r\}$ - фактор группа, где $\widehat{G}_k$ - нормальный делитель индекса $r \geq 1$.

Определение 2. *Совокупность величин $h = \{h_x, x \in G_k\}$ называется $\widehat{G}_k$ - слабо периодической, если $h_x = h_{ij}$ при $x \in H_i, x_\downarrow \in H_j$ для $\forall x \in G_k$.*

Определение 3. *Мера μ называется $\widehat{G}_k$-(слабо) периодической, если она соответствует $\widehat{G}_k$-(слабо) периодической совокупности величин h.*

Целью работы является описание новых слабо периодических гиббсовских мер для модели Изинга, отличных от мер, которые получены в [8] и [9].

3. Слабо периодические меры

Заметим, что любой нормальный делитель индекса 2 группы G_k имеет вид $H_A = \{x \in G_k : \sum\limits_{i\in A} w_x(a_i) -$ четно$\}$, где $\emptyset \neq A \subseteq N_k = \{1, 2, ..., k+1\}$ и $w_x(a_i) -$ число букв a_i в слове $x \in G_k$ (см.[4]). Опишем H_A-слабо периодические меры Гиббса. Заметим, что в случае $|A| = k+1$, т.е. $A = N_k$ понятие слабо периодичности совпадает с обычной периодичностью, где $|A|$ обозначает число элементов множества A. Поэтому рассмотрим $A \subset N_k$ такое, что $A \neq N_k$. Тогда в силу (4) H_A-слабо периодическая совокупность h имеет вид

$$h_x = \begin{cases} h_1, & x \in H_A,\ x_\downarrow \in H_A \\ h_2, & x \in H_A,\ x_\downarrow \in G_k \backslash H_A \\ h_3, & x \in G_k \backslash H_A,\ x_\downarrow \in H_A \\ h_4, & x \in G_k \backslash H_A, x_\downarrow \in G_k \backslash H_A, \end{cases} \tag{5}$$

где $h_i, i = \overline{1,4}$, удовлетворяет системе уравнений:

$$\begin{cases} h_1 = |A| f(h_3, \theta) + (k - |A|) f(h_1, \theta) \\ h_2 = (|A| - 1) f(h_3, \theta) + (k + 1 - |A|) f(h_1, \theta) \\ h_3 = (|A| - 1) f(h_2, \theta) + (k + 1 - |A|) f(h_4, \theta) \\ h_4 = |A| f(h_2, \theta) + (k - |A|) f(h_4, \theta). \end{cases} \tag{6}$$

Рассмотрим отображение $W : R^4 \to R^4$, определенное следующим образом:

$$\begin{cases} h'_1 = |A| f(h_3, \theta) + (k - |A|) f(h_1, \theta) \\ h'_2 = (|A| - 1) f(h_3, \theta) + (k + 1 - |A|) f(h_1, \theta) \\ h'_3 = (|A| - 1) f(h_2, \theta) + (k + 1 - |A|) f(h_4, \theta) \\ h'_4 = |A| f(h_2, \theta) + (k - |A|) f(h_4, \theta). \end{cases} \tag{7}$$

Заметим, что (6) есть уравнение $h = W(h)$.

Легко показать, что отображение W имеет инвариантные множества следующих видов:

$$I_1 = \{h \in R^4 : h_1 = h_2 = h_3 = h_4\}, \quad I_2 = \{h \in R^4 : h_1 = h_4; h_2 = h_3\}$$

$$I_3 = \{h \in R^4 : h_1 = -h_4; h_2 = -h_3\}.$$

Обозначим $\alpha = \frac{1-\theta}{1+\theta}$. В работе [8] доказана следующая

Теорема 2. *1) Для модели Изинга все H_A-слабо периодические меры Гиббса на I_1, I_2 являются трансляционно-инвариантными.*

2) При $|A| = k$ и $\theta > 0$ все H_A - слабо периодические меры Гиббса являются трансляционно-инвариантными.

3) При $|A| = 1, k = 4$ существует критическое значение $\alpha_{cr} (\approx 0,152)$ такое, что при $0 < \alpha < \alpha_{cr}$ существуют пять H_A-слабо периодические меры Гиббса

$\mu_0, \mu_1^-, \mu_1^+, \mu_2^-, \mu_2^+$; *при* $\alpha = \alpha_{cr}$ *существуют три* H_A*-слабо периодические меры Гиббса* μ_0, μ_1^-, μ_1^+; *при* $\alpha > \alpha_{cr}$ *существует единственная* H_A*-слабо периодическая мера Гиббса* μ_0.

4) При $|A| = 1, k > 5$ *и* $\theta \in (\theta_1, \theta_2)$ *на* I_3 *существуют три* H_A *- слабо периодические меры Гиббса* μ^-, μ^0, μ^+ *где* $\theta_{1,2} = \frac{k-1\pm\sqrt{k^2-6k+1}}{2k}$.

Во втором пункте теоремы 2 рассматривается случай $\theta > 0$. Поэтому естественно рассмотреть случай $\theta < 0 (\alpha > 1)$.

Пользуясь тем, что $f(h, \theta) = arcth(\theta thh) = \frac{1}{2}\ln\frac{(1+\theta)e^{2h}+(1-\theta)}{(1-\theta)e^{2h}+(1+\theta)}$ и обозначая $z_i = e^{2h_i}$, где $(i = \overline{1,4})$, из (7) получим следующую систему уравнений

$$\begin{cases} z_1 = (\frac{z_3+\alpha}{\alpha z_3+1})^{|A|} \cdot (\frac{z_1+\alpha}{\alpha z_1+1})^{(k-|A|)} \\ z_2 = (\frac{z_3+\alpha}{\alpha z_3+1})^{|A|-1} \cdot (\frac{z_1+\alpha}{\alpha z_1+1})^{(k+1-|A|)} \\ z_3 = (\frac{z_2+\alpha}{\alpha z_2+1})^{|A|-1} \cdot (\frac{z_4+\alpha}{\alpha z_4+1})^{(k+1-|A|)} \\ z_4 = (\frac{z_2+\alpha}{\alpha z_2+1})^{|A|} \cdot (\frac{z_4+\alpha}{\alpha z_4+1})^{(k-|A|)}. \end{cases} \tag{8}$$

Введем следующее обозначение $f(x) = \frac{x+\alpha}{\alpha x+1}$. Тогда система уравнений (8) при $|A| = k$ сводится к следующей системе уравнений

$$\begin{cases} z_1 = (f(z_3))^k \\ z_2 = (f(z_3))^{k-1} \cdot (f(z_1)) \\ z_3 = (f(z_2))^{k-1} \cdot (f(z_4)) \\ z_4 = (f(z_2))^k. \end{cases} \tag{9}$$

Справедлива следующая

Теорема 3. *Пусть* $|A| = k, \alpha > 1$.
1) При $k \leq 3$ *все* H_A- *слабо периодические меры Гиббса на* I_3 *являются трансляционно-инвариантными.*
2) При $k = 4$ *существует критическое значение* $\alpha_{cr} (\approx 6,3716)$, *такое, что при* $\alpha < \alpha_{cr}$ *на* I_3 *существует одна* H_A- *слабо периодическая мера Гиббса; при* $\alpha = \alpha_{cr}$ *на* I_3 *существует три* H_A- *слабо периодические меры Гиббса; при* $\alpha > \alpha_{cr}$ *на* I_3 *существует пять* H_A- *слабо периодические меры Гиббса.*

Доказательство. Система уравнений (9) на инвариантном множестве I_3 имеет следующий вид:

$$\begin{cases} z_1 = \left(f(\frac{1}{z_2})\right)^k \\ z_2 = \left(f(\frac{1}{z_2})\right)^{k-1} \cdot (f(z_1)). \end{cases} \tag{10}$$

Подставляя первое уравнение (10) во второе, получим

$$z_2 = \left(\frac{1+\alpha z_2}{\alpha+z_2}\right) \frac{\alpha(\alpha+z_2)^k + (1+\alpha z_2)^k}{(\alpha+z_2)^k + \alpha(1+\alpha z_2)^k}. \tag{11}$$

Введем обозначение $u = \frac{z_2+\alpha}{\alpha z_2+1}$. Тогда уравнение (11) сводится к уравнению

$$u^{2k} - \alpha u^{2k-1} + \alpha^2 u^{k+1} - \alpha^2 u^{k-1} + \alpha u - 1 = 0. \tag{12}$$

Заметим, что уравнение (12) можно переписать в виде

$$(u^2 - 1)P_{2k-2}(u) = 0, \tag{13}$$

где $P_{2k-2}(u)-$ симметрический многочлен степени $2k-2$. Обозначая $u + \frac{1}{u} = \xi$, степень уравнения $P_{2k-2}(u) = 0$ можно уменьшить в два раза, т.е. привести к виду $P_{k-1}(\xi) = 0$. Но при $k \geq 6$ уравнение не решается в кубатуре.

Сначало докажем второй пункт теоремы 2. Пусть $k = 4$. В этом случае уравнение (13) имеет следующий вид

$$(u^2 - 1)\left(u^6 - \alpha u^5 + u^4 + (\alpha^2 - \alpha)u^3 + u^2 - \alpha u + 1\right) = 0. \tag{14}$$

Отсюда $u^2 - 1 = 0$ или

$$u^6 - \alpha u^5 + u^4 + (\alpha^2 - \alpha)u^3 + u^2 - \alpha u + 1 = 0. \tag{15}$$

Так как $u > 0$, то $u = 1$ является одним из решений уравнения (14) для любого $\alpha > 0$. Рассмотрим уравнение (15). Обозначив $\xi = u + \frac{1}{u} > 2$, получим следующее уравнение

$$\xi^3 - \alpha\xi^2 - 2\xi + \alpha^2 + \alpha = 0.$$

Рассмотрим функцию $\gamma(\xi) = \xi^3 - \alpha\xi^2 - 2\xi + \alpha^2 + \alpha = 0$ и изучим ее. Очевидно, что $\gamma(2) > 0$ при всех $\alpha > 1$. Из $\gamma'(\xi) = 0$ получим $\xi = \xi_* = \frac{\alpha+\sqrt{\alpha^2+6}}{3}$. Из $\xi_* > 2$ находим, что $\alpha > 2,5$. Если $\gamma(\xi_*) < 0$, то уравнение $\gamma(\xi) = 0$ имеет точно два решения $\xi_1 > 2, \xi_2 > 2$. Из $u + \frac{1}{u} = \xi$ получим четыре решения уравнения (15). Таким образом, в случае $\alpha > \alpha_{cr}$ уравнение (14) имеет 5 решений, где критическое значение $\alpha_{cr}(\approx 6,3716)$ находится из уравнения $\gamma(\xi_*) = 0$ т.е.

$$9\alpha + 27\alpha^2 - 2\alpha^3 = 2(\sqrt{\alpha^2+6})^3.$$

Рассмотрим $\psi(\alpha) = 2\alpha^3 - 27\alpha^2 - 9\alpha + 2(\sqrt{\alpha^2+6})^3, \alpha > 2,5$. Заметим, что $\psi(\alpha)$ возрастает в интервале $(\alpha', +\infty)$, где $\alpha' = \frac{48+\sqrt{264}}{12} > 5$. Так как $\psi(5) < 0$, из монотонности ψ следует существование и единственность α_{cr} такое, что $\psi(\alpha_{cr}) = 0$. В случае $\alpha = \alpha_{cr}$ уравнение $\gamma(\xi) = 0$ имеет единственное решение $\xi = \xi_* > 2$. Из $u + \frac{1}{u} = \xi$ получим два решения уравнения (15). Следовательно уравнение (14) имеет три решения. А в случае $\alpha < \alpha_{cr}$ уравнение $\gamma(\xi) = 0$ не имеет решений $\xi = \xi_* > 2$. Следовательно, в этом случае уравнение (14) имеет единственное решение $u = 1$.

Теперь докажем первый пункт теоремы 2. Пусть $k = 3$. Тогда уравнение (13) имеет следующий вид

$$(u^2 - 1)(u^4 - \alpha u^3 + (\alpha^2 + 1)u^2 - \alpha u + 1) = 0. \tag{16}$$

В этом случае тоже $u = 1$ является одним из решений уравнения (16). Поэтому предположим, что $u \neq 1$. Тогда из (16) имеем

$$u^4 - \alpha u^3 + (\alpha^2 + 1)u^2 - \alpha u + 1 = 0.$$

Обозначая $\xi = u + \frac{1}{u}$, получим следующее квадратное уравнение

$$\xi^2 + \alpha\xi + \alpha^2 - 1 = 0.$$

Легко показать, что это уравнение при $\xi > 2$ и $\alpha > 1$ не имеет решения, следовательно, уравнение (16) не имеет решения, кроме $u = 1$.

Аналогично рассуждая, легко доказать, что при $k \leq 2$ уравнение (12) не имеет решения, кроме $u = 1$. Теорема доказана. □

Замечание 1. *Заметим, что одна из мер, найденных в пункте 2 теоремы 3, является трансляционно-инвариантной, а все остальные являются H_A- слабо периодическими (не периодическими), которые отличаются от мер, найденных в [8] и [9].*

Замечание 2. *Компьютерный анализ показывает, что утверждения пункта 2 теоремы 3 верны для всех $k \geq 4$, т.е. независимо от значения k на инвариантном множестве I_3 существуют не более пяти H_A- слабо периодических мер Гиббса.*

Замечание 3. *В [9] при одном нормальном делителе индекса 4 получены не менее 7 слабо периодических мер Гиббса, где критическое значение α совпадает с α_{cr}.*

Теорема 4. *Пусть $|A| = k, \quad k \geq 6$, $\alpha > 1$ и $\alpha_{1,2} = \frac{k-1\pm\sqrt{k^2-6k+1}}{2}$. Тогда верны следующие утверждения:*
1) При $\alpha \in (\alpha_1, \alpha_2)$ существуют не менее трех H_A - слабо периодических мер Гиббса.
2) При $\alpha \notin (\alpha_1, \alpha_2)$ существует не менее одной H_A - слабо периодической меры Гиббса.

Доказательство. Первое и четвертое уравнения из (9) подставим в третье и во второе уранения той же системы, соответственно. А в полученной системе уравнений третье уравнение подставим во второе и получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} z_1 = (f(z_3))^k \\ z_2 = \left(f\left((f(z_2))^{k-1} \cdot f\left((f(z_2))^k\right)\right)\right)^{k-1} \cdot f\left(\left(f\left((f(z_2))^{k-1} \cdot f\left((f(z_2))^k\right)\right)\right)^k\right) \\ z_3 = (f(z_2))^{k-1} \cdot f((f(z_2))^k) \\ z_4 = (f(z_2))^k. \end{cases}$$



Рис. 2: *График функции* $\varphi(x)$ *и* $y = x$ *при* $k = 5 \quad \alpha = 3$.

Введем следующее обозначение:

$$\varphi(x) = \left(f\left((f(x))^{k-1} \cdot f\left((f(x))^k\right)\right)\right)^{k-1} \cdot f\left(\left(f\left((f(x))^{k-1} \cdot f\left((f(x))^k\right)\right)\right)^k\right). \quad (17)$$

Известно, что функция $f(x)$ ограничена, отсюда следует, что и $\varphi(x)$ тоже будет ограниченной. Ясно, что

$$\varphi(0) > 0; \quad \varphi(1) = 1.$$

Рассмотрим производную функции $\varphi(x)$:

$$\varphi'(x) = \left(f\left((f(x))^{k-1} f\left((f(x))^k\right)\right)\right)^{k-2} f'\left((f(x))^{k-1} f\left((f(x))^k\right)\right)(f(x))^{k-2} f'(x) \times$$

$$\left[kf\left((f(x))^k\right) - f\left((f(x))^k\right) + kf'\left((f(x))^k\right)(f(x))^k\right] \times$$

$$\left\{kf\left(\left(f\left((f(x))^{k-1} f\left((f(x))^k\right)\right)\right)^k\right) - f\left(\left(f\left((f(x))^{k-1} f\left((f(x))^k\right)\right)\right)^k\right) + \right.$$

$$\left. kf'\left(\left(f\left((f(x))^{k-1} f\left((f(x))^k\right)\right)\right)^k\right)\left(f\left((f(x))^{k-1} f\left((f(x))^k\right)\right)\right)^k\right\}.$$

Учитывая

$$f(1)=1, f'(1)=\frac{1-\alpha}{1+\alpha},$$

имеем

$$\varphi'(1)=\frac{(\alpha-1)^2(\alpha+1-2k)^2}{(1+\alpha)^4}. \tag{18}$$

При $\varphi'(1)>1$ графики функций $y=\varphi(x)$ и $y=x$ как минимум пересекаются трижды, т.е. уравнение (17) имеет не менее трех решений. Поэтому будем решать следующее неравенство:

$$\varphi'(1)>1. \tag{19}$$

Из (18) и (19) получим

$$\frac{4(\alpha-\frac{k-1}{k+1})(\alpha-\alpha_1)(\alpha-\alpha_2)}{(k+1)(1+\alpha)^4}<0,$$

где α_1,α_2 определены в теореме 3.

Ясно, что если $k<5$, то α_1,α_2 являются комплексными, а если $k=5$, то $\alpha_1=\alpha_2$ и неравенство (19) имеет решение

$$(-\infty,\frac{k-1}{k+1}),$$

но α должна принадлежать интервалу $(1,+\infty)$.

Теперь рассмотрим $k\geq 6$, тогда неравенство (19) имеет решение (α_1,α_2). В этом случае система уравнений (16) имеет три решения, т.е. существует три H_A-слабо периодические меры Гиббса. При $\alpha\notin(\alpha_1,\alpha_2)$ прямая $y=x$ и график функции $y=\varphi(x)$ пересекаются в точке $(1;1)$ т.е. существует не менее одной H_A- слабопериодической меры Гиббса. Теорема доказана. □

Замечание 4. *Заметим, что одна из мер, найденных в теореме 4, является трансляционно-инвариантной, а все остальные являются H_A- слабо периодическими (не периодическими), которые являются новыми.*

Замечание 5. *Также заметим, что при некоторых $\alpha\in(1,+\infty)$ появляются новые H_A- слабо периодические меры Гиббса, отличные от мер из Теоремы 4. Например, при $k=5$, $\alpha=3$ из рисунка 2 и из ограниченности функции $y=\varphi(x)$ можно убедиться, что существуют пять H_A- слабо периодических мер Гиббса, одна из которых является трансляционно-инвариантной.*

Замечание 6. *Новые меры Гиббса, описанные в теоремах 3 и 4, дают возможность описать континуум множества непериодических гиббсовских мер, отличных от ранее известных.*

4. Обсуждение

Широко распространена (см. [13]- [16]) формулировка модели Изинга, согласно которой каждому узлу x решетки сопоставляется переменная $\sigma(x)$, принимающая численные значения $+1$ или -1.

Если "объекты связанные с узлами x и x', находятся в одном состоянии, то $\sigma(x)\sigma(x') = +1$, а если в разных, то $\sigma(x)\sigma(x') = -1$. Ясно, что в такой интерпретации понятие "объекта связанного с узлом x, может трактоваться весьма широко. Это могут быть, например, магнитный момент иона в кристалле, имеющей два возможных направления [17] или атомы двух сортов в бинарном сплаве [18](значение $\sigma(x) = +1$ соответсвует занятию x-го узла атомом одного сорта, а $\sigma(x) = -1$-атомом другого сорта). Другие интерпретации модели Изинга связаны исследованием явления адсорбции на поверхности [19], плавлением ДНК [20], теорией решеточного газа [21] и целым рядом других вопросов теории фазового перехода типа порядок-безпорядок.

Для рассматриваемой модели на τ^4 найдено критическое значение $\alpha_{cr}(\approx 6,3716)$, такое, что при $\alpha = \alpha_{cr}$ существует три H_A- слабо периодические меры Гиббса; при $\alpha > \alpha_{cr}$ существуют пять H_A- слабо периодические меры Гиббса. Также для этой модели на дереве Кэли τ^k при $k \geq 6$ доказано существование не менее трех слабо периодических мер Гиббса. Различные гиббсовские меры соответствуют различным фазам системы. В этом случае существуют фазовые переходы.

Заметим, что построенные в наших случаях фазы отличаются от известных фаз этой модели, что они соответствуют слабо периодическим мерам Гиббса (см. [5], [8]-[11]).

Благодарность. Автор выражает глубокую признательность профессору У. А. Розикову за постановку задачи и полезные советы по работе.

Список литературы

[1] Rozikov U.A. *Gibbs measures on Cayley trees* (World scientific.,2013).

[2] Блехер П.М.,Ганиходжаев Н.Н. *Теория вероят. и ее примен.*,**35**(2), 920-930 (1990).

[3] Zachary S. *Ann. Prob.*,**11**, 894-903 (1983).

[4] Ганиходжаев Н.Н., Розиков У.А. *ТМФ*,**111**(1), 109-117 (1997).

[5] Gandolfo, D., Ruiz, J., Shlosman, *J. Stat. Phys.* **153**(3), 400-411 (2013). *ТМФ*,**112**(1), 170-176 (1997).

[6] Розиков У.А. *ТМФ*,**112**(1), 170-176 (1997).

[7] Розиков У.А. *ТМФ*,**118**(1), 95-104 (1999).

[8] Розиков У.А., Рахматуллаев М.М. *ТМФ*,**156**(2), 292-302 (2008).

[9] Розиков У.А., Рахматуллаев М.М. *ТМФ*,**160**(3), 507-516 (2009).

[10] Розиков У.А., Рахматуллаев М.М. *Доклады АН РУз*,**4**, 12-15 (2008).

[11] Розиков У.А., Рахматуллаев М.М. *УзМЖ*,**2**, 144-152 (2009).

[12] Ганиходжаев Н.Н. *Доклады АН РУз*,**4**, 3-5 (1994).

[13] Я.Г. Синай, *Теория фазовых переходов. Строгые результаты.* (Наука.М., 1980).

[14] C.Preston, *Gibbs states on countable sets.* (Cambridge Univ. Press,1974.)

[15] Малышев В.А., Минлос Р.А. *Гиббсовские случайные поля* (Наука.М., 1985).

[16] Рюэль Д. *Статистическая механика* (Мир.М., 1971).

[17] de Jongh L.J., Miedema A.R. *Adv. Phys.*,**23**, 397-413 (1974).

[18] Фейман Р. *Статистическая механика* (Мир.М., 1978).

[19] Kasteleyn P.W. *Phase transitions. In: Fundamental Problems in Statistical Mechanics.II. Proc. of 2nd NUFFIC Int.Summer Course(Noordwijk, The Netherlands, 1967)* (New York, 1968).

[20] Zimm B., Doty P., Iso K. *Proc. Nat. Acad.Sci.USA*,**45**, 160 (1959).

[21] Хуанг К. *Статистическая механика* (Мир.М., 1966).

Сведения об авторе

1. Рахматуллаев Музаффар Мухаммаджанович, канд. физ. мат. наук, старший научный сотрудник института математики при Национальном Университете Узбекистана.
адрес: Институт математики, ул. Дурмон йули, 29, Ташкент, 100125, Узбекистан.
e-mail: mrahmatullaev@rambler.ru